



【MTX(40歳以上)療法について】

(メソトレキセート)



ID:

様

1

コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、治療のお薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7
パロノセトロン注 デキサート注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分														
メソトレキセート注	抗がん剤	6時間		腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。 無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。							腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。 無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。					
ロイコボリン注 メイロン注 ダイアモックス注	副作用を抑えるためのお薬		...	...	...	注射の期間は、採血の 結果によって決まります。				...	...	...	注射の期間は、採血の 結果によって決まります。			

治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
自覚 症状	食欲不振・吐き気														
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。													
	口内炎														
	下痢														
検査 値	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)														
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。													
	白血球減少														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいなどを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。													
	赤血球減少(貧血)														
検査 値		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。													
	血小板減少														
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。													
	肝機能障害														
検査 値		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。													
	腎機能低下														
検査 値		顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出る場合があります。													



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。