



【R-MPV療法について】
(リツキシマブ+メソトレキセート+プロカルバジン+オンコビン)



ID: _____

様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
塩酸プロカルバジン カプセル	抗がん剤	1日3回 内服																																	
フェキシフェナジン錠 アセトアミノフェン錠	アレルギー予防	1日1回 内服																																	
ソル・コーテフ注		30分																																	
リツキシマブ注	分子標的薬	約3時間～										この週は お休みです。														この週は お休みです。									
アロカリス注 パロノセトロン注	吐き気止め	30分																																	
オンコビン注	抗がん剤	30分			腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。 無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。 																														
メソトレキセート注	抗がん剤	3時間																																	
ロイコボリン注 メイロン注 ダイアモックス注	副作用を抑えるためのお薬								 注射の期間は、採血の 結果によって決まります。																 注射の期間は、採血の 結果によって決まります。										

この週はお休みです。

この週はお休みです。

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。
無理のない程度に水分補給をして、頻尿に尿を出しましょう。

注射の期間は、採血の結果によって決まります。

注射の期間は、採血の結果によって決まります。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																														
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	食欲不振・吐き気																														
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	口内炎																														
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。菌磨き、うがいなど丁寧に行きましょう。																													
	下痢																														
	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																														
便秘																															
	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																														
手足のしびれ																															
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																														
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																															
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																														
検査値	白血球減少																														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																														
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
	血小板減少																														
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																														
肝機能低下																															
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																														
腎機能低下																															
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																														

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。