



【TMZ Bev 6W療法について】 (テモダール+アバステン)



ID:

様

1



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	～	42	43	44	45	46	47	48	49	
ペバシズマブ注 (アバستن注)	分子標的薬	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分																2週間間隔で行います。														
グラニセトン注	吐き気止め	30分																					～		維持療法までは 4週間お休みです。							
テモダール注	抗がん剤	1時間30分																					～									
放射線治療	専用の治療室で行います	治療スケジュールに従い、基本的に月～金は放射線をあてます。土日はお休みです。		42日間連日行います。 (放射線治療の延長で最大49日間まで延長)																												



治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	～	42	43	44	45	46	47	48	49							
自覚症状	食欲不振・吐き気																					～															
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																			
	頭痛																					～															
		症状があるときはお知らせ下さい。																																			
	便秘																						～														
水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																																					
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							～														
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																																				
検査値	白血球・リンパ球減少																					～															
		感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																			
	赤血球減少(貧血)																					～															
貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																					
血小板減少																					～																
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																				

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部