



【1wPAC療法について】 (パクリタキセル)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目
ポラミン注 ファモチジン注 デキサート注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																													
パクリタキセル注	抗がん剤	1時間																													



治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目
自覚症状	過敏症																												
	食欲不振・吐き気																												
	関節痛・筋肉痛																												
	口内炎																												
	手足のしびれ																												
	爪症状																												
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																												
検査値	白血球減少																												
	赤血球減少(貧血)																												
	血小板減少																												
	肝機能低下																												



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※パクリタキセルは点滴中にアルコールを含むため、**点滴当日の自動車運転はお避けください。**ご家族による送迎、公共交通機関をご利用ください。

香川大学医学部附属病院薬剤部