



【wPAC+3wHER+PER療法について】
(パクリタキセル+トラスツズマブ+パージェタ)



ID:

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
ポラミン注 ファモチジン注 デキサート注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																						
パージェタ注	分子標的薬	初回1時間 2回目以降30分																						
パクリタキセル注	抗がん剤	1時間																						
トラスツズマブ注	分子標的薬	初回1時間30分 2回目以降30分																						



治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																							
	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																							
	食欲不振・吐き気																							
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	関節痛・筋肉痛																							
	肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																							
	口内炎																							
検査値	手足のしびれ																							
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																							
	爪症状																							
	爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																							
	白血球減少																							
検査値	赤血球減少(貧血)																							
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							
体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなることがあります。																								

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部

※パクリタキセルは点滴中にアルコールを含むため、**点滴当日の自動車運転は避けください。**ご家族による送迎、公共交通機関をご利用ください。