

コース目



薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目
デキサート注 ポララミン注	アレルギー予防	30分																														
アービタックス注	分子標的薬	初回2時間 2回目以降1時間																														
ビラフトビカプセル	分子標的薬	1日1回																														
メクトビ錠	分子標的薬	1日2回		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												




:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目	2	3	4	5	6	7	
自覚症状	アレルギー様症状																																				
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																																				
	食欲不振・吐き気																																				
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																				
	口内炎																																				
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																																				
	下痢																																				
	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																																				
手足のしびれ																																					
手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																																					
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																																					
にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																																					
眼症状																																					
視力が下がる、虫が飛んでるように見える、眼の充血、いつもよりまぶしく感じる、近くの物のピントが合いにくいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																																					
検査値	赤血球減少(貧血)																																				
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																				
肝機能低下																																					
体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																																					

その他、急にイボができて大きくなる、表面がテカテカした青黒いほくろの様なイボができる、皮膚の表面がただれる、手足に力が入らない。

心機能障害(動くと苦しい、息切れ、呼吸困難、脈が乱れる、疲れやすい)等の症状があればご連絡ください。



香川大学医学部附属病院薬剤部