



【CPT11+Cmab(隔週)療法について】 (イリノテカン+アービタックス)



ID: _____

様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
アロカリス注 パロノセトロン注 デキサート注 ボララミン注		アレルギー予防 吐き気止め	30分																													
アービタックス注		分子標的薬	2時間																													
イリノテカン注		抗がん剤	1時間30分																													

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																													
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	食欲不振・吐き気																													
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	下痢																													
便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																														
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																														
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																														
にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																														
検査値	白血球減少																													
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいをおこなってください。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																													
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
血小板減少																														
出血しやすくなって手足に赤い点やあざができたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																														



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部