



【CPT11+Pmab療法について】 (イリノテカン+ベクティビックス)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	
アロカリス注 パロノセトロン注 デキサート注			アレルギー予防 吐き気止め	30分									 この週は お休みです。														 この週は お休みです。							
ベクティビックス注			分子標的薬	1時間																														
イリノテカン注			抗がん剤	1時間30分																														



治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																												
			発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																										
	食欲不振・吐き気																												
			食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																										
	下痢																												
			便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																										
検査値	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																												
			髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																										
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																												
			にきびのような発疹がでたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																										
	白血球減少																												
			感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心に心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																										
検査値	赤血球減少(貧血)																												
			貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																										
	血小板減少																												
			出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																										



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部