



## 【FOLFIRI+RAM療法について】

(5-FU+レボホリナート+イリノテカン+サイラムザ)



ID: \_\_\_\_\_

様

1

コース目



**お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前                         |  |  | 作用               | めやすの時間            | 1日目 | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 | 2 | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 |  |  |
|------------------------------|--|--|------------------|-------------------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----|-----|---|---------|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|-----|--|--|
| アロカリス薬<br>パロノセトロン注<br>デキサート注 |  |  | アレルギー予防<br>吐き気止め | 30分               |     |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |     |   |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |     |  |  |
| サイラムザ注                       |  |  | 分子標的薬            | 初回1時間<br>2回目以降30分 |     |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |     |   |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |     |  |  |
| イリノテカン注                      |  |  | 抗がん剤             | 1時間30分            |     | 同時に点滴開始 |   |   |   |   |   |   | この週は<br>お休みです。 |    |    |    |    |    |     |   | 同時に点滴開始 |   |   |   |   |   |   | この週は<br>お休みです。 |    |    |    |    |     |  |  |
| レボホリナート注                     |  |  | 5-FUの効果を<br>強める薬 | 2時間               |     | 同時に点滴開始 |   |   |   |   |   |   | この週は<br>お休みです。 |    |    |    |    |    |     |   | 同時に点滴開始 |   |   |   |   |   |   | この週は<br>お休みです。 |    |    |    |    |     |  |  |
| 5-FU注                        |  |  | 抗がん剤             | 15分               |     |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |     |   |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |     |  |  |
| 5-FU注(持続)                    |  |  | 抗がん剤             | 46時間              |     |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |     |   |         |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |     |  |  |



## 治療による副作用

：注意が必要な時期

|          |                 | 1日目                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| 自覚<br>症状 | アレルギー様症状        |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          | 食欲不振・吐き気        |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          | 口内炎             |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
| 検査<br>値  | 下痢              |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          | 色素沈着            |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
| 検査<br>値  | 脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など) |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 髪質が少し変わることもあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          | 白血球減少           |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
| 検査<br>値  |                 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがい等を心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          | 赤血球減少(貧血)       |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
| 検査<br>値  | 血小板減少           |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|          |                 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛み、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部