



【FOLFOXIRI+BV療法について】

(5-FU+レボホリナート+オキサリプラチン+イリノテカン+ベバシズマブ)



ID:



様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目		
アロカリス注 パロノセトロン注 デキサート注		アレルギー予防 吐き気止め	30分																															
ベバシズマブ注 (アバستن注)		分子標的薬	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分																															
イリノテカン注		抗がん剤	1時間30分									 この週は お休みです。															 この週は お休みです。							
オキサリプラチン注 (エルプラット注)		抗がん剤	2時間		 同時に点滴開始														 同時に点滴開始															
レボホリナート注		5-FUの効果 を強める薬	2時間		 同時に点滴開始														 同時に点滴開始															
5-FU注		抗がん剤	48時間																															



治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	過敏症																												
	食欲不振・吐き気																												
	口内炎																												
	下痢																												
	手足のしびれ																												
	色素沈着																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																												
検査値	白血球減少																												
	赤血球減少(貧血)																												
	血小板減少																												

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部