



【mFOLFOX6+Pani療法について】 (5-FU+レボホリナート+オキサリプラチン+ベクティビックス)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
アロカリス注 パロノセトロン注 デキサート注	アレルギー予防 吐き気止め	30分																														
ベクティビックス注	分子標的薬	1時間																														
オキサリプラチン注 (エルプラット注)	抗がん剤	2時間		同時に点滴開始							 この週は お休みです。								 この週は お休みです。													
レボホリナート注	5-FUの効果を 強める薬																															
5-FU注	抗がん剤	15分																														
5-FU注(持続)	抗がん剤	46時間																														



治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																												
	食欲不振・吐き気																												
	手足のしびれ																												
	口内炎																												
	色素沈着																												
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																												
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																												
検査値	白血球減少																												
	赤血球減少(貧血)																												
	血小板減少																												
	肝機能低下																												



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部