



お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
オプジーボ注	免疫力を高める薬	30分										この週はお休みです。							この週はお休みです。							この週はお休みです。						




治療による副作用

オプジーボを使用されている方へ

オブジーボ使用中に気をつける症状

- オブジーボ投与に注意が必要な方**
- 間質性肺炎と診断されたことがある方
 - 自己免疫疾患と診断されたことがある方
 - 臓器移植（造血幹細胞移植を含む）を受けたことがある方
 - 結核にかかった方、または過去にかかったことがある方

オブジーボの点滴後に以下のような症状が起こることがあります。
症状がみられたら、医師へ相談してください。




※玄関の内扉や冷蔵庫などの目につきやすい場所に貼ってください。

オブジーボを使用されている方へ

オプジーボ使用中に気をつける症状

- オプジーボ投与に
注意が必要な方**
- 間質性肺炎と診断されたことがある方
 - 自己免疫疾患と診断されたことがある方
 - 臓器移植（造血幹細胞移植を含む）を受けたことがある方
 - 結核にかかっている方、または過去にかかったことがある方

オプジーボの点滴後に以下のような症状が起こることがあります。
症状がみられたら、医師へ相談してください。



※玄関の内扉や冷蔵庫などの目につきやすい場所に貼ってください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュール、副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになれないことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

小野薬品HP オプジーボ使用中に気をつける症状より参照

香川大学医学部附属病院薬剤部