



【FOLFOX療法について】

(5-FU+レボホリナート+オキサリプラチン)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
アロカリス注 パロノセトロン注 デキサート注		アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																													
オキサリプラチン注 (エルプラット注)		抗がん剤	2時間		同時に点滴開始						この週は お休みです。						同時に点滴開始						この週は お休みです。									
レボホリナート注		5-FUの効果を 高める薬																														
5-FU注		抗がん剤	15分																													
5-FU注(持続)		抗がん剤	46時間																													



治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚 症状	過敏症																													
	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	食欲不振・吐き気																													
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	口内炎																													
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																													
色素沈着																														
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																														
手足のしびれ																														
手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																														
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
髪質が少し変わることもあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																														
検 査 値	白血球減少																													
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																													
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
血小板減少																														
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																														
肝機能低下																														
体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																														



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部