



様


1

コース目



:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																					
	口内炎																						
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																					
	下痢																						
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																					
手足のしびれ																							
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																						
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
	髪質が少し変わることもあります。治療後半程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																						
検査値	白血球減少																						
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	血小板減少																						
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
腎機能低下																							
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																						



香川大学医学部附属病院薬剤部

テビムブラ®の治療により予測される副作用

テビムブラ®の投与中または投与後に下記のような副作用があらわれることがあります。

