



【ACT-D single療法について】 (コスメゲン)



ID:

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
グラネセロン注 デキサート注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分															
コスメゲン注	抗がん剤	15分															



治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気														
			食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。												
	口内炎														
			口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。												
検査値	色素沈着														
			肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)														
			髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。												
検査値	白血球減少														
			感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。												
	赤血球減少(貧血)														
			貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。												
検査値	血小板減少														
			出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。												
	肝機能低下														
			体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。												



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部