



# 【DC+Pembrolizumab療法について】 (ドセタキセル+カルボプラチン+キイトルーダ)



ID:

様

1

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強に残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前                         | 作用                | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|------------------------------|-------------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| キイトルーダ                       | 免疫力を高める薬          | 30分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| アロカリス注<br>パロノセトロン注<br>デキサート注 | アレルギー予防・<br>吐き気止め | 30分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| ドセタキセル注                      | 抗がん剤              | 1時間    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| カルボプラチン注                     | 抗がん剤              | 2時間    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

## ☺ 治療による副作用

: 注意が必要な時期

|      |                                                                     | 1日目                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気                                                            |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 口内炎                                                                 |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 手足のしびれ                                                              |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。                                        |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 検査値  | 爪症状                                                                 |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)                                                     |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 白血球減少                                                               |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 検査値  | 赤血球減少(貧血)                                                           |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 血小板減少                                                               |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 検査値  | 肝機能低下                                                               |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      |                                                                     | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

手や足のむくみ(治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部

## キイトルーダ®の副作用として予測される症状

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 頭痛                      | 下垂体機能障害、脳炎・髄膜炎など                                            |
| 意識がうすれる                 | 1型糖尿病、脳炎・髄膜炎など                                              |
| 見え方の異常                  | ぶどう膜炎                                                       |
| まぶたが重い・<br>顔の筋肉が動きにくくなる | 重症筋無力症                                                      |
| 口の中や喉が渇きやすい・<br>多飲      | 1型糖尿病                                                       |
| 菌ぐきや口内の出血               | 免疫性血小板減少性紫斑病、<br>血球貪食症候群                                    |
| くしゃみ                    | 点滴時の過敏症反応                                                   |
| 声のかすれ                   | 甲状腺機能障害など                                                   |
| くちびるのただれ                | 重度の皮膚障害                                                     |
| 咳                       | 間質性肺疾患、心筋炎、結核                                               |
| たん・血たん                  | 結核                                                          |
| 息切れ・呼吸困難                | 間質性肺疾患、ギラン・バレー症候群、<br>重症筋無力症、点滴時の過敏症反応、<br>心筋炎、溶血性貧血、赤芽球癆など |
| 胸の痛み                    | 心筋炎                                                         |
| 吐き気やおう吐                 | 大腸炎・小腸炎、副腎機能障害、<br>脳炎・髄膜炎、1型糖尿病など                           |
| 食欲不振                    | 肝機能障害、肝炎、下垂体機能障害、<br>副腎機能障害など                               |



|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 下痢         | 大腸炎・小腸炎など                                                   |
| ネバネバした便・血便 | 大腸炎・小腸炎                                                     |
| 便秘         | 甲状腺機能障害、副腎機能障害                                              |
| 腹痛         | 大腸炎・小腸炎、肺炎、1型糖尿病、<br>硬化性胆管炎                                 |
| トイレに近い     | 1型糖尿病                                                       |
| 血尿         | 腎機能障害、免疫性血小板減少性紫斑病                                          |
| 尿量の減少      | 腎機能障害                                                       |
| 手足に力が入らない  | ギラン・バレー症候群、筋炎・横紋筋融解症、<br>重症筋無力症                             |
| 手指のふるえ     | 甲状腺機能障害など                                                   |
| 全身         |                                                             |
| 発熱         | 間質性肺疾患、大腸炎・小腸炎、腎機能障害、<br>重度の皮膚障害、心筋炎、無顆粒球症、<br>血球貪食症候群、結核など |
| 疲れやすい・だるい  | 大腸炎・小腸炎、肝機能障害、肝炎、<br>甲状腺機能障害、副腎機能障害、結核など                    |
| 黄疸         | 肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、肺炎、<br>溶血性貧血                                |
| 発疹などの皮膚症状  | 点滴時の過敏症反応、重度の皮膚障害、<br>免疫性血小板減少性紫斑病、<br>硬化性胆管炎、血球貪食症候群など     |
| 体重の減少      | 副腎機能障害、1型糖尿病、結核など                                           |
| 体重の増加      | 甲状腺機能障害、腎機能障害                                               |
| むくみ        | 甲状腺機能障害、腎機能障害、心筋炎                                           |
| けいれん       | 脳炎・髄膜炎、血球貪食症候群                                              |
| しびれ        | ギラン・バレー症候群                                                  |

このほか、気になる症状があらわれた場合には、治療日記に記入しておき、次回診察時に担当の医師に、お伝えください。



MSD製薬HP

キイトルーダ®の特に注意すべき副作用より参照