



【リブタヨ療法について】

(リブタヨ)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
リブタヨ注	免疫力を高める薬	30分									この週はお休みです。							この週はお休みです。						



治療による副作用

「

頭痛 下垂体機能障害、脳炎・髄膜炎など

意識がうすれる 1型糖尿病、脳炎・髄膜炎など

見え方の異常 ぶどう膜炎

まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる 重症筋無力症

口の中や喉が渇きやすい・多飲 1型糖尿病

歯ぐきや口内の出血 免疫性血小板減少性紫斑病、血球貪食症候群

くしゃみ 点滴時の過敏症反応

声のかすれ 甲状腺機能障害など

くちびろのただれ 重度の皮膚障害

咳 間質性肺疾患、心筋炎、結核

たん・血たん 結核

息切れ・呼吸困難 間質性肺疾患、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、点滴時の過敏症反応、心筋炎、溶血性貧血、赤芽球病など

胸の痛み 心筋炎

吐き気やおう吐 大腸炎・小腸炎、副腎機能障害、脳炎・髄膜炎、1型糖尿病、重度の胃炎など

食欲不振 劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎、下垂体機能障害、副腎機能障害、重度の胃炎など

下痢 大腸炎・小腸炎など

ネバネバした便・血便 大腸炎・小腸炎

便秘 甲状腺機能障害、副腎機能障害

腹痛 大腸炎・小腸炎、膵炎、1型糖尿病、硬化性胆管炎

トイレが近い 1型糖尿病

血尿 腎機能障害、免疫性血小板減少性紫斑病

尿量の減少 腎機能障害

手足に力が入らない ギラン・バレー症候群、筋炎・横紋筋融解症、重症筋無力症

手指のふるえ 甲状腺機能障害など

全身

発熱 間質性肺疾患、大腸炎・小腸炎、腎機能障害、重度の皮膚障害、心筋炎、無顆粒球症、血球貪食症候群、結核など

疲れやすい・だるい 大腸炎・小腸炎、劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎、甲状腺機能障害、副腎機能障害、結核など

黄疸 劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎、膵炎、溶血性貧血

発疹などの皮膚症状 点滴時の過敏症反応、重度の皮膚障害、免疫性血小板減少性紫斑病、硬化性胆管炎、血球貪食症候群など

体重の減少 副腎機能障害、1型糖尿病、結核など

体重の増加 甲状腺機能障害、腎機能障害

むくみ 甲状腺機能障害、腎機能障害、心筋炎

けいれん 脳炎・髄膜炎、血球貪食症候群

しびれ ギラン・バレー症候群

記載の症状やその他気になる体調の変化がある場合は、すぐに医師や看護師、薬剤師にご連絡ください。



」



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

MSD製薬HP

キイトルダ®の特に注意すべき副作用より参照、一部改変

香川大学医学部附属病院薬剤部