



【チソツマブ ベドチン療法について】

(テブダック)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	前日	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
フルメロン点眼液 等	副腎皮質ステロイド点眼剤 (炎症を抑える目薬)	テブダック前日から 投与2日後まで																							
アイファガン点眼液	血管収縮点眼剤 (眼の血流を低下させる目薬)	テブダック 投与直前に1回																							
ヒアレイン点眼液 等	ドライアイ治療点眼剤 (眼の乾きを抑える目薬)	テブダック投与 終了後30日目まで																							
テブダック注	分子標的薬 (抗がん剤)	30分			開始5分前から投与終了後30分間は 冷却パックで両眼を冷やしてください。																				



治療による副作用

：注意が必要な時期

			前日	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
	食欲不振・吐き気																								
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	眼障害																								
		眼の充血・腫れ、かゆみ・痛み・不快感、乾き、見えにくさなどの症状があらわれた場合はお知らせ下さい。治療中のコンタクトレンズの装着は避けてください。																							
	皮膚障害																								
		広い範囲の皮膚の赤みや38℃以上の高熱、口唇や陰部のただれ、排尿・排便時の痛みなどの症状があらわれた場合はお知らせ下さい。																							
手足のしびれ																									
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																								
脱毛																									
	髪質が少し変わることもあります。が、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																								
検査値	白血球減少																								
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心に行いましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																								
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																							
	血小板減少																								
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
	肝機能低下																								
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																							

・出血が起こることがあります。鼻血が出たときは氷などで冷やし、小鼻を指で5分程度圧迫し出血が止まるまで安静にしましょう。その他の出血や、止血できない場合はお知らせ下さい。

・腸炎・腸閉塞が起こることがあります。腹痛や吐き気、お腹の張りなどの症状が現れた時はお知らせ下さい。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部