



様

1

コース目



薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アロカリス注 パロノセトロン注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																						
ポララミン注 デキサート注																								
アービタックス注	分子標的薬	初回2時間 2回目以降1時間																						
カルボプラチン注	抗がん剤	1時間																						
5-FU注	抗がん剤	96時間																						



:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	アレルギー様症状																					
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																				
	食欲不振・吐き気																					
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																				
	口内炎																					
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																				
	下痢																					
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出るときはお知らせ下さい。																				
手足のしびれ																						
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																					
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																						
	にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																					
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	髪質が少し変わることもあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																					
検査値	白血球減少																					
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																				
	赤血球減少(貧血)																					
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																				
血小板減少																						
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																					
腎機能低下																						
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																					

