



## 【ERB単独療法について】 (アービタックス)



ID: \_\_\_\_\_

様

1

コース目



**お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前             | 作用      | めやすの時間            | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 |
|------------------|---------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| デキサート注<br>ポララミン注 | アレルギー予防 | 30分               |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |
| アービタックス注         | 分子標的薬   | 初回2時間<br>2回目以降1時間 |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |



## 治療による副作用

: 注意が必要な時期

|      |                                                     | 1日目                                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日目 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 自覚症状 | アレルギー様症状                                            |                                                                               |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |
|      | 発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 |                                                                               |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |
|      | 皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)                                   |                                                                               |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |
|      |                                                     | にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。 |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部