



様

1

コース目

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アロカリス注	吐き気止め	30分																							
パロノセトロン注	アレルギー予防・吐き気止め	30分																							
ポララミン注 デキサート注																									
アービタックス注	分子標的薬	初回2時間 2回目以降1時間																							
ドセタキセル注	抗がん剤	1時間																							
マンニトール注	利尿剤	1時間																							
シスプラチン注	抗がん剤	2時間		腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。 無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。 																					

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																						
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																						
	食欲不振・吐き気																						
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
	口内炎																						
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																						
	手足のしびれ																						
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																						
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																							
にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																							
爪症状																							
爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。																							
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																							
検査値	白血球減少																						
	感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)																						
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
	血小板減少																						
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
腎機能低下																							
顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																							

手や足のむくみ(治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。)

