



【Avelumab+Axitinib療法について】

(バベンチオ+インライタ)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
アセリオ注	アレルギー予防	30分															
ポララミン注	アレルギー予防	30分															
バベンチオ注	免疫力を高める薬	4回目まで2時間 5回目以降1時間															
インライタ錠	分子標的薬	1日2回 内服															



治療による副作用

:注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	アレルギー様症状														
			発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。												
	食欲不振・吐き気														
			食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。												
	手足症候群														
			手足がチクチクと痛い、赤く腫れる、ひび割れ、水疱が生じることがあるので、保湿剤を使い手足の乾燥を予防しましょう。												
	下痢														
			便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。												
	発声障害														
			しゃべりにくさ、声が変わることがあります。喉を乾燥させないように十分な水分を摂りましょう。												
検査値	肝機能低下														
			体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。												

・甲状腺機能障害が起こることがあります。元気がない、疲れやすい、まぶたが腫れぼったい、いつも眠いなどの症状が現れた時はお知らせ下さい。

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部

特に注意を要する副作用

目

- ・まぶたのはれ(→P13)
- ・白目が黄色くなる(→P14)
- ・視野が狭くなる(→P17)
- ・眼がはれぼったい(→P15)
- ・まぶたが下がる、物がだぶって見える(→P16)

胃腸

- ・吐き気、嘔吐(→P13、P14、P15、P17)
- ・急に胃のあたりがひどく痛む(→P13)
- ・食欲不振(→P14、P17)
- ・腹痛(→P13、P14)
- ・下痢(→P14)
- ・血便(→P14)

膀胱

- ・尿の色が濃くなる(→P14)
- ・尿の量が増える(→P14)
- ・排尿回数が増える(→P17)
- ・尿量が減る(→P15)
- ・血尿(→P15)
- ・赤褐色尿(→P16)

子宮

- ・月経がない(→P17)

手足

- ・手足のふるえ(→P14、P17)
- ・指先・手足のしびれ(→P15、P16)
- ・歩行困難、運動のまひ、感覚のまひ、手足の痛み(→P15)
- ・手足のこわばり(→P16)

頭

- ・頭痛(→P15、P16、P17)
- ・意識障害(→P13)
- ・意識がうすれる(→P17)
- ・意識の低下(→P15、P16)

口・のど

- ・唇・舌のはれ(→P13)
- ・甲状腺のはれ(→P17)
- ・しゃがれ声(→P13)
- ・水を多く飲む(→P17)
- ・のどの渇き(→P14、P17)
- ・飲み込みにくい(→P16)

胸

- ・息切れ、呼吸困難(→P13、P15)
- ・咳(→P13)
- ・胸がドキドキする(→P17)
- ・動悸(→P13、P15)
- ・胸痛(→P15)
- ・息苦しい(→P15)

全身

- ・発熱(→P13、P14、P15、P16)
- ・さむけ(→P13)
- ・寒がりになる(→P17)
- ・めまい(→P13)
- ・血圧低下(→P13、P17)
- ・じんましん(→P13)
- ・からだのだるい、疲れやすい(→P14、P15、P17)
- ・関節痛などのかぜに似た症状(→P15)
- ・むくみ(→P15、P17)
- ・筋肉の痛み(→P16)
- ・体重が減る(→P14、P17)
- ・汗をかきやすい(→P17)
- ・不眠(→P17)
- ・かゆみ(→P14)
- ・発疹(→P16)
- ・急激な血糖値の上昇(→P14)
- ・乳汁が出る(→P17)
- ・からだに力が入らない(→P16)
- ・筋力が低下する(→P16)
- ・まひ(→P16)

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

メルクバイオファーマ株式会社HP

「バベンチオ®による治療を受ける患者さんへ」より参照