



1

## コース目



## 治療による副作用

:注意が必要な時期



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部



# 【アザシチジン点滴療法について】



ID: \_\_\_\_\_様

1

コース目



**お薬の名前と治療のスケジュール**（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。）

| 薬の名前               |       |        | 作用                                                                                | めやすの時間                                                                            | 1日目                                                                               | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                          | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                                                                                  | 17                         | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 |                                                                                     |  |
|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ナゼア錠               | 吐き気止め | 点滴30分前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div>この週は<br/>お休みです。</div> |    |    |    |    |    |    |  | <div>この週は<br/>お休みです。</div> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
| アザシチジン注<br>(ビダーザ注) | 抗がん剤  | 10分    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                            |    |    |    |    |    |    |                                                                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                                                                                     |  |



## 治療による副作用

\_\_\_\_\_: 注意が必要な時期

|              |           | 1日目                                                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 自覚<br>症<br>状 | 食欲不振・吐き気  |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|              |           | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 便秘           |           |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|              |           | 水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 検<br>査<br>値  | 白血球減少     |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|              |           | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいをおこなってください。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|              | 赤血球減少(貧血) |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|              |           | 貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 血小板減少        |           |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|              |           | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部