



【Atezolizumab 4w療法について】

(テセントリク)



ID: _____

様

1 コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
テセントリク注	免疫力を高める薬	初回1時間 2回目以降30分									この週はお休みです。							この週はお休みです。							この週はお休みです。						



治療による副作用

テセントリクの主な副作用の症状

■ 目

- 白目が黄色くなる……………肝機能障害、肝炎 p25
- 目の充血……………重度の皮膚障害 p32
- 物が見えにくい……………下重体機能障害 p30
- 物が二重に見える……………重症筋無力症 p31
- まぶたが腫れぼったい……………重度の皮膚障害 p32
- まぶたが下がったまま戻らない……………重症筋無力症 p31

■ 顔

- 顔のむくみ……………血球貪食症候群 p34

■ 胃・腸

- 吐き気、嘔吐……………肝機能障害、肝炎 p25、肺炎 p26、1型糖尿病 p27、副腎機能障害 p29、脳炎、髄膜炎 p30、腎機能障害 p32、薬剤の注入に伴う反応 p35
- 食欲がない……………肝機能障害、肝炎 p25、甲状腺機能障害 p28、副腎機能障害 p29、下重体機能障害 p30、腎機能障害 p32、肺炎、横紋筋融解症 p33
- 腹痛……………大腸炎、重度の下痢 p25、肺炎 p26、1型糖尿病 p27、副腎機能障害 p29、血球貪食症候群 p34
- 便秘……………甲状腺機能障害 p28
- いつもより排便回数が多い……………大腸炎、重度の下痢 p25、甲状腺機能障害 p28、副腎機能障害 p29、血球貪食症候群 p34
- 便が泥状か水のように……………大腸炎、重度の下痢 p25、甲状腺機能障害 p28、副腎機能障害 p29、腎機能障害 p32、血球貪食症候群 p34
- 便に血が混じる……………大腸炎、重度の下痢 p25
- お腹が張る……………血球貪食症候群 p34

■ 膀胱

- 尿が褐色になる……………肝機能障害、肝炎 p25
- 尿の量や回数が増える……………1型糖尿病 p27、下重体機能障害 p30
- 尿の量が減る・増える……………腎機能障害 p32

■ 子宮

- 月経がない……………下重体機能障害 p30

■ 手・足

- 物がつかみづらい……………神経障害 p31
- 注射部位のほてり、痛み……………薬剤の注入に伴う反応 p35
- 手足がピリピリしひれる、ジンジン痛み、手足の感覚がなくなる、歩行時につまづく、手足の皮膚が冷たい……………神経障害 p31
- 手足に力が入らない……………神経障害 p31、重症筋無力症 p31、肺炎、横紋筋融解症 p33
- 手足のむくみ……………心筋炎 p33

これらの症状は、併用するお薬によっても起こることがあります。併用療法でみられる副作用はp36-37をご参照ください。

■ 頭

- 頭痛……………下重体機能障害 p30、脳炎、髄膜炎 p30
- 意識がはっきりしない……………1型糖尿病 p27、脳炎、髄膜炎 p30

■ のど

- 口が渇く、たくさんの水分が欲しくなる……………1型糖尿病 p27、下重体機能障害 p30
- のどが痛む……………重度の皮膚障害 p32
- 食べ物がうまく飲み込めない……………重症筋無力症 p31

■ 胸

- 息切れ、息苦しい……………間質性肺疾患 p24、重症筋無力症 p31、肺炎、横紋筋融解症 p33、心筋炎 p33
- 薬剤の注入に伴う反応 p35
- 咳が出る……………間質性肺疾患 p24
- 動悸……………甲状腺機能障害 p28、心筋炎 p33
- 胸の痛み……………心筋炎 p33
- 乳汁分泌……………下重体機能障害 p30

■ 背中

- 背中の痛み……………肺炎 p26

■ 全身

- 発熱……………間質性肺疾患 p24、肝機能障害、肝炎 p25、甲状腺機能障害 p28、脳炎、髄膜炎 p30、重度の皮膚障害 p32、腎機能障害 p32、肺炎、横紋筋融解症 p33、血球貪食症候群 p34、薬剤の注入に伴う反応 p35、発熱性好中球減少症 p35
- 副腎機能障害 p29
- 肝機能障害、肝炎 p25、1型糖尿病 p27、甲状腺機能障害 p28、副腎機能障害 p29、下重体機能障害 p30、腎機能障害 p32、肺炎、横紋筋融解症 p33、心筋炎 p33、血球貪食症候群 p34
- 腎機能障害 p32
- むくみ……………腎機能障害 p32
- 筋肉痛……………肺炎、横紋筋融解症 p33
- 体重の増減……………1型糖尿病 p27、甲状腺機能障害 p28、副腎機能障害 p29、肺炎、横紋筋融解症 p33
- 眠が浅くなる……………甲状腺機能障害 p28
- 暑がり、汗を多くかく……………甲状腺機能障害 p28
- かゆみ……………薬剤の注入に伴う反応 p35
- 皮膚が黄色くなる……………肝機能障害、肝炎 p25
- 発疹……………腎機能障害 p32、血球貪食症候群 p34、薬剤の注入に伴う反応 p35
- 水ぶくれ、皮膚・粘膜のはがれ・たれ……………重度の皮膚障害 p32
- 関節部分もしくは広範囲にわたり皮膚が赤くなる……………重度の皮膚障害 p32
- ふるえ……………甲状腺機能障害 p28
- 血圧の低下……………副腎機能障害 p29
- 出血、血が止まりにくい……………血球貪食症候群 p34
- けいれん……………血球貪食症候群 p34

主要な副作用

副作用の重症化

主要な副作用の重症化



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

中外製薬HP

「テセントリクによる治療を受けられる患者さんへ」より参照

香川大学医学部附属病院薬剤部