



# 【CDDP+VP16療法について】 (シスプラチン+エトポシド)



ID:

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前               | 作用                | めやすの時間 | 1日目 | 2                                                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16             | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|--------------------|-------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|-----|
| アロカリス注<br>パロノセトロン注 | アレルギー予防・<br>吐き気止め | 30分    |     |                                                      |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |     |
| デキサート注             |                   |        |     |                                                      |   |   |   |   |   |   | この週は<br>お休みです。 |    |    |    |    |    |    | この週は<br>お休みです。 |    |    |    |    |    |     |
| 硫酸Mg注<br>ランソックス注   | 副作用予防             | 30分    |     |                                                      |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |     |
| シスプラチン注            | 抗がん剤              | 2時間    |     | 腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。 |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |     |
| エトポシド注             | 抗がん剤              | 2時間    |     |                                                      |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |     |



## 治療による副作用

:注意が必要な時期

|      |                                                   | 1日目                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |  |  |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気                                          |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      |                                                   | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 口内炎                                               |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      |                                                   | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 手足のしびれ                                            |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。                      |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)                                   |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。 |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
| 検査値  | 白血球減少                                             |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      |                                                   | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 赤血球減少(貧血)                                         |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      |                                                   | 貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 血小板減少                                             |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      |                                                   | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 腎機能低下                                             |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。                |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 肝機能低下                                             |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |
|      | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。             |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。