



【CP療法(weekly CBDCA+PTX)について】 (カルボプラチン+パクリタキセル)



様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
ボラミン注 ファモチジン注 デキサート注		アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																															
グラニセトン注		吐き気止め	30分																								毎週を6回 繰り返す							
パクリタキセル注		抗がん剤	1時間																															
カルボプラチン注		抗がん剤	1時間																															
放射線治療		専用の治療室で行います		治療スケジュールに従い、基本的に月～金は放射線をあてます。土日はお休みです。																														

毎週を6回
繰り返す



治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	過敏症																												
	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	食欲不振・吐き気																												
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	筋肉痛・関節痛																												
	肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																												
	口内炎																												
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																												
手足のしびれ																													
手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																													
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																													
爪症状																													
爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。																													
放射線皮膚炎																													
放射線を当てた部分が赤くなったり、ヒリヒリすることがあります。塗り薬で対処することもあります。放射線を当てる前は塗らないでください。																													
検査値	白血球減少																												
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)																												
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
血小板減少																													
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																													
肝機能低下																													
体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																													



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部

※パクリタキセルは点滴中にアルコールを含むため、**点滴当日の自動車運転は避けください。**ご家族による送迎、公共交通機関をご利用ください。