



【Sci-Ami+Laz療法について】

(リブロファズ+ラズクルーズ)



ID:

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
エリキュース錠	血栓予防	1日2回 内服																																
ミノサイクリン錠 等	皮膚障害予防	1日2回 内服																																
デカドロン錠	アレルギー予防	投与1時間前に内服																																
フェキソフェナジン錠 アセトアミノフェン錠																																		
リブロファズ皮下注	分子標的薬	5分																																
ラズクルーズ錠	分子標的薬	1日1回 内服																																



治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚 症 状	アレルギー様症状																													
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	口内炎																													
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																													
	下痢																													
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																												
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																													
	にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																													
検 査 値	肝機能低下																													
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																													

●間質性肺炎に注意してください。空咳、息切れ等の症状がある場合は、速やかに連絡して下さい。

●急激なむくみに注意してください。体重増加、まぶたが腫れぼったい、靴が履きにくい等の症状があれば自己判断で対処せず、医療機関へ連絡してください。

●血栓・塞栓に注意してください。足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない等の症状があれば速やかに連絡してください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部



【Sci-Ami+Laz療法について】 (リプロファズ+ラズクルーズ)



ID:

様

2

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
エリキュース錠	血栓予防	1日2回 内服																														
ミノサイクリン錠 等	皮膚障害予防	1日2回 内服																														
フェキソフェナジン錠 アセトアミノフェン錠	アレルギー予防	投与1時間前に内服																														
リプロファズ皮下注	分子標的薬	5分																														
ラズクルーズ錠	分子標的薬	1日1回 内服																														



治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																													
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	口内炎																													
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																												
	下痢																													
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																												
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																														
	にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。爪の周りに腫れや痛みが出ることがあります。																													
検査値	肝機能低下																													
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																												

●間質性肺炎に注意してください。空咳、息切れ等の症状がある場合は、速やかに連絡して下さい。

●急激なむくみに注意してください。体重増加、まぶたが腫れぼったい、靴が履きにくい等の症状があれば自己判断で対処せず、医療機関へ連絡してください。

●血栓・塞栓に注意してください。足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない等の症状があれば速やかに連絡してください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部