



コース目

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目					
パロノセトロン注 プレドニン注	吐き気止め 副腎皮質ステロイド	30分																												
ドキシルビシン注	抗がん剤	30分		尿が赤くなることがあります。							 この週はお休みです。							 この週はお休みです。												
オンコビン注	抗がん剤	1分																												
エンドキサン注	抗がん剤	1時間30分																												
プレドニン錠	副腎皮質ステロイド	内服						胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。 食欲が低下しますので、手洗い・うがい・心掛けをお願いします。																						


朝 錠、昼 錠

:注意が必要な時期

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																					
	不眠																						
		寝つきが悪くなる時があります。症状があるときはお知らせください。																					
	胃部不快感																						
		胃の痛みやゲップ、むかつき、腹部膨満感、食欲がないなど、気になる症状があるときはお知らせください。																					
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
		排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状予防のため、無理のない範囲で水分を摂り、頻繁に尿を出しましょう。																					
	口内炎																						
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																						
便秘																							
	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																						
発熱																							
	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																						
手足のしびれ																							
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																						
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																						
検査値	白血球減少																						
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
血小板減少																							
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																						

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



香川大学医学部附属病院薬剤部