



【Pola-BR(2コース目以降)療法について】 (リツキシマブ+ポライビー+ベンダムスチン)



ID: _____

様

2

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
フェキソフェナジン錠 アセトアミノフェン錠	アレルギー予防・ 吐き気止め	1日1回 内服																														
パロノセトロン注 デキサート注		1時間																														
デキサート注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分										この週は お休みです。							この週は お休みです。							この週は お休みです。						
ポライビー注	分子標的薬 (抗がん剤)	30分																														
リツキシマブ注	分子標的薬	約3時間～																														
ベンダムスチン注	抗がん剤	10分																														



治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																													
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	血管痛・静脈炎																													
		点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																												
	食欲不振・吐き気																													
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
自覚症状	手足のしびれ																													
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																												
	便秘																													
		水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																												
検査値	白血球減少																													
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心に行いましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)																													
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少																													
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												
検査値	肝機能低下																													
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																												

皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。