



【Bortezomib(週1回)療法について】
(ボルテゾミブ)



ID: _____様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1日目
レナデックス錠	副腎皮質ステロイド	1日1回 内服																																				
ボルテゾミブ注 (ベルケイド注)	抗がん剤	1分																																				



この週は
お休みです。



治療による副作用

_____: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	1日目										
自覚症状	発熱																																														
		悪寒、発熱があるときはお知らせ下さい。																																													
	倦怠感																																														
		疲れ、脱力感などを感じたときは無理せず、体を休めてください。																																													
手足のしびれ																																															
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																																														
検査値	白血球減少																																														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心しましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																													
	赤血球減少(貧血)																																														
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																													
血小板減少																																															
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																														

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ
- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)
- その他の副作用・・・発疹・皮疹、貧血、不眠 など



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。