



【sc-DBd(1コース目)療法について】

(ダラキューロ+ボルテゾミブ)



ID:

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミンコーワ錠 アセトアミノフェン錠 モンテルカスト錠	アレルギー予防・ 吐き気止め	内服																						
デキサート注		1時間																						
ダラキューロ皮下注	分子標的薬	3-5分																						
ボルテゾミブ注 (ベルケイド注)	抗がん剤	1分																						



治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚 症状	アレルギー様症状																						
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	下痢																						
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																					
手足のしびれ																							
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																						
検 査 値	白血球減少																						
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいをお願いします。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	血小板減少																						
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
肝機能低下																							
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																						

●心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●肺の症状(治療開始から起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●糖尿病がある人は血糖上昇することがありますので注意してください。

血栓予防の薬を服用することがあります。



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部



【sc-DBd(2～3コース目)療法について】 (ダラキューロ+ボルテゾミブ)



ID:

様

2

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミンコーワ錠 アセトアミノフェン錠 モンテルカスト錠	アレルギー予防・ 吐き気止め	内服																						
ダラキューロ皮下注	分子標的薬	3-5分																						
ボルテゾミブ注 (ベルケイド注)	抗がん剤	1分																						

※別途レナデックス錠(副腎皮質ステロイド)の内服指示があります。



治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																						
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	下痢																						
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																					
手足のしびれ																							
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																						
検査値	白血球減少																						
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいをお願いします。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	血小板減少																						
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
肝機能低下																							
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																						

●心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●肺の症状(治療開始から起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●糖尿病がある人は血糖上昇することがありますので注意してください。

血栓予防の薬を服用することがあります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部



【sc-DBd(4～8コース目)療法について】 (ダラキューロ+ボルテゾミブ)



ID:

様

4

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
レスタミンコーワ錠 アセトアミノフェン錠 モンテルカスト錠	アレルギー予防・ 吐き気止め	内服																						
ダラキューロ皮下注	分子標的薬	3-5分																						
ボルテゾミブ注 (ベルケイド注)	抗がん剤	1分																						

※別途レナデックス錠(副腎皮質ステロイド)の内服指示があります。



治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																						
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	下痢																						
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る場合はお知らせ下さい。																					
手足のしびれ																							
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																						
検査値	白血球減少																						
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心しましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	血小板減少																						
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
肝機能低下																							
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																					

●心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●肺の症状(治療開始から起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●糖尿病がある人は血糖上昇することがありますので注意してください。

血栓予防の薬を服用することがあります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部



【sc-DBd(9コース目以降)療法について】
(ダラキューロ)



ID: 様

9

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
レスタミンコーワ錠 アセトアミノフェン錠 モンテルカスト錠	アレルギー予防・ 吐き気止め	内服																													
ダラキューロ皮下注	分子標的薬	3-5分																													

※別途レナデックス錠(副腎皮質ステロイド)の内服指示があります。



治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚 症状	アレルギー様症状																													
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
検 査 値	白血球減少																													
		感染しやすくなりますので、手洗いうがい心をかけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)																													
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少																													
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

●心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●肺の症状(治療開始から起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

●糖尿病がある人は血糖上昇することがありますので注意してください。

血栓予防の薬を服用することがあります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部