



【STZ+5-FU療法について】

(ザノサー+5-FU)



ID: _____

様

1

コース目



お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	～	42	1日目	
アロカリス注 パロノセトロン注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																															
デキサート注													この週は お休みです。								この週は お休みです。								この週は お休みです。				
5-FU注	抗がん剤	30分																															
ザノサー注	抗がん剤	30分																															



治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	～	42	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	血管痛																														
		点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																													
	口内炎																														
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																													
便秘																															
	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																														
色素沈着																															
	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																														
検査値	白血球減少																														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																														
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																													
	血小板減少																														
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																													
腎機能低下																															
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																														
肝機能低下																															
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																														

高血糖症状が出ることがあります。口渇、多尿、多飲、だるさなどの症状が出ます。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部