



様

1

コース目



薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
アロカリス注 パロノセトロン注	アレルギー予防・ 吐き気止め	30分																									
デキサート注																											
エトポシド注	抗がん剤	2時間																									
マンニトール注	利尿剤	1時間						腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。 無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。 																			
シスプラチン注	抗がん剤	2時間																									
ブレオ注	抗がん剤	1時間																									



:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	発熱																						
	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																						
	食欲不振・吐き気																						
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
	口内炎																						
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																						
自覚症状	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	髪質が少し変わることもあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																						
	色素沈着																						
	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																						
	手足のしびれ																						
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																						
検査値	白血球減少																						
	感染しやすくなりますので、手洗い・うがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)																						
	貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
	血小板減少																						
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
検査値	腎機能低下																						
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																						
	肝機能低下																						
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																						

肺の症状(治療開始から2～6ヶ月ほどで起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

