



【VIP療法について】

(エトポシド＋イホマイド＋シスプラチン)



ID: _____

様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アロカリス注	アレルギー予防・吐き気止め	30分																						
グラニセロン注 デキサート注																								
エトポシド注	抗がん剤	2時間																						
イホマイド注	抗がん剤	2時間						腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。 無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。																
マンニトール注	利尿剤	30分																						
シスプラチン注	抗がん剤	2時間								この週はお休みです。														
マンニトール注	利尿剤	30分																						
ウロミテキサン注	膀胱を保護するお薬	各5分																						

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																					
	口内炎																						
		口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																					
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
		排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状予防のため、無理のない範囲で水分を摂り、頻繁に尿を出しましょう。																					
自覚症状	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
		髪質が少し変わることもあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																					
	色素沈着																						
		肌が黒ずむ場合があります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																					
	手足のしびれ																						
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																					
検査値	白血球減少																						
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
		貧血の症状(動作時の息切れ、動悸)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	血小板減少																						
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																					
検査値	腎機能低下																						
		顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出る場合があります。																					
	肝機能低下																						
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																					



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。