

肝心かなめの 肝臓 のはなし

13

香川大学医学部消化器・神経内科教授
正木 勉

C型肝炎ウイルス駆除後の フォローの重要性

前号で、C型肝炎ウイルスは
今では簡単に経口剤で駆除でき
ることを述べました。今月号の
テーマは、「C型肝炎ウイルス
駆除後は、肝細胞がんに進展し
ないのか?」。答えは残念ながら
NOです。

香川県内の995例のデータ


を観察すると、経口剤による治療後、2年で約3%の人にがんが発生しています(図1)。もちろん10月号でお話ししたように、C型肝炎ウイルスを駆除すると、肝細胞がんの発生頻度は明らかに低下します。それなのに、なぜC型肝炎ウイルス駆除後2年で、3%(ウイルス駆除患者100人のうち3人)もがん発生率があるのか。副作用が少ない経口ウイルス薬は、これまでの治療できなかった肝硬変でも治療できますが、C型肝炎ウイルスを駆除しても、がんの発生しやすい肝硬変が残るからです。この肝硬変を改善するには、C型肝炎ウイルスを駆除するよりも時間がかかります。よって、特に肝硬変になった

段階でウイルス駆除をした患者は、その後も少なくとも年4回の腫瘍マーカーと、年2回の画像検査(負担の少ない腹部エコーなど)を受けることが大切です。

“ウイルスを駆除したら絶対

安心”ではないことに注意してください。定期的に専門医に受診することが重要です。次号は、B型肝炎、C型肝炎の撲滅を目指した香川県の取り組みについてお話ししたいと思います。

経口ウイルス薬投与後の 累積新規発がん率



(図1)